

# ミノキシジル2% ロゲイン

## 取り扱い説明書

ロゲイン2%（女性用）は、アメリカに本社を置く Johnson & Johnson Consumer Inc. で製造されたFAGA治療薬（外用薬）です。

有効成分「ミノキシジル」を2%配合したローションタイプの発毛剤で、頭皮に直接塗布して使います。

### ミノキシジルの薬理薬効

有効成分ミノキシジルは、血管を拡張させることで毛根への栄養供給を改善し、発毛を促進します。また、この作用によって、休止期の状態に入ったヘアサイクルを成長期に移行させ、髪の毛の成長を助ける様々な成長因子の産生も促します。

### ロゲイン2%（女性用）の特徴

ロゲイン2%（女性用）を毎日使用すると、毛包が活性化し、より太く、豊かで、若々しい髪が再生します。頭皮上部の髪が全体的に薄くなっている女性に最適です。4カ月で髪が再生することが臨床的に証明されています。1本60ml入り（約1カ月分）の商品です。

## 使用方法

スポイトを使用して、ミノキシジル配合剤を**1日2回**、以下の3ステップの要領で頭頂部に塗布してください。中蓋は上から蓋を垂直に押しながら、反時計回りに回してください。空回りする場合は、強く押しながら空回りしないポイントで蓋を回してください。

1. 乾いた髪、または湿った髪（濡れていない髪）のタオルドライから始めます。頭皮を最大限に露出させるために、髪を数列に分けます。
2. 指示に従って、溶液を1日2回使用してください。スポイトを1mlまで満たし、治療したい部分に当てます。
3. スポイト溶液をゆっくりと放出し、髪が薄くなっている部分に均等にマッサージします。溶液を頭皮に吸収させ、完全に自然乾燥させてから、ブロードライまたはヘアスタイリングをします。



## ！ 使用上の注意

次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

- 皮膚：頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
- 精神神経系：頭痛、気が遠くなる、めまい
- 循環器：胸の痛み、心拍が速くなる
- 代謝系：原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

## 保管方法

- ・高温多湿を避けて、直射日光があたらないところで保管してください。
- ・お子様の手が届かないところで保管してください。
- ・使用期限を過ぎた場合は破棄してください。



## 使用禁止

- ・本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ・男性（男性用のミノキシジルをご使用ください）
- ・未成年者（18歳未満）
- ・妊娠又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人
- ・妊娠、出産に伴い脱毛している人
- ・避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人
- ・壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人
- ・頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人
- ・脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人
- ・頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人

## 使用禁止部位

- ・本剤は**頭皮にのみ使用**し、内服しないでください。血圧が下がる等のおそれがあります。
- ・きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮はきず等を悪化させることがあります。
- ・本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、避けてください。これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

## 使用前に確認

- ・今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
- ・高血圧の人、低血圧の人
- ・心臓又は腎臓に障害のある人
- ・むくみのある人
- ・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人
- ・高齢者（65歳以上）
- ・甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）のある人